



CULTIVO: Avena forrajera (*Avena sativa*)

CICLO: Anual.

RÉGIMEN DE HUMEDAD: Temporal.

ZONA ECOLÓGICA: Árido templado (Altiplano), Semiárido semicálido (Cañones).

VARIEDAD: Cuauhtémoc, Chihuahua y Cusihuiachi.

FECHA DE ESTABLECIMIENTO: Desde el establecimiento de las lluvias hasta el 10 de agosto.

DENSIDAD DE SIEMBRA: 100 kg/ha.

CONTROL DE PLAGAS, MALEZAS Y ENFERMEDADES: Puede atacar el pulgón del follaje y se controla con Pirimor 50 W a 0.5 kg/ha, o Malatión 1000 E a 1.0 L/ha, o Lannate 90 PS a razón de 0.4 kg/ha, o Folimat 84 LM a 0.4 L/ha. Ocasionalmente en ataques fuertes de gusano soldado, controlar con un L/ha de Gusatión Metílico 20 E, 0.5 kg/ha de Lannate 90 PS 25, o 1 L/ha de Malatión 1000 E.

FERTILIZACIÓN AL ESTABLECIMIENTO: Se recomienda incorporar con rastra antes de la siembra la fórmula 60-40-00.

INICIO DEL CORTE O PASTOREO: Aproximadamente a los 60-65 días de la siembra se recomienda el inicio del pastoreo. Si se quiere cortar para empacar se puede cortar en floración o grano formado.

RENDIMIENTO ANUAL DE MATERIA SECA (MS): Dependiendo del manejo se pueden obtener desde 1.5 hasta 3.0 t/ha.