



CULTIVO: Trébol Alejandrino (*Trifolium alexandrinum*)

CICLO: Anual.

RÉGIMEN DE HUMEDAD: Riego.

ZONA ECOLÓGICA: Árido templado (Altiplano).

VARIEDAD: Multicut.

FECHA DE ESTABLECIMIENTO: Todo el año. En época de heladas (15 de octubre al 15 de marzo) se requiere amadrinar con avena ya que es susceptible a heladas.

DENSIDAD DE SIEMBRA: 30 kg/ha.

FERTILIZACIÓN AL ESTABLECIMIENTO: Se recomienda incorporar con rastra antes de la siembra la fórmula 00-100-00.

PROGRAMA DE RIEGOS: El de siembra y riegos de auxilio cada dos o tres semanas hasta su establecimiento. En el período de utilización, después del corte o pastoreo, previa fertilización, cada 32 días, en la época seca se pueden requerir de dos riegos entre cortes o pastoreos.

INICIO DEL CORTE O PASTOREO: Aproximadamente a los 120 días de la siembra se recomienda el inicio del pastoreo o corte. Si se quiere adelantar el pastoreo y protegerlo de las heladas invernales, se puede "amadrinar" la siembra con 50 kg/ha de avena, y se podrá iniciar a los 90 días.

RENDIMIENTO ANUAL DE MATERIA SECA (MS): Produce de 20 a 25 t/ha.