



**CULTIVO: Trigo forrajero (*Triticum aestivum*)**

**CICLO:** Anual.

**RÉGIMEN DE HUMEDAD:** Temporal.

**ZONA ECOLÓGICA:** Árido templado (Altiplano), Semiárido semicálido (Cañones).

**VARIEDAD:** Salamanca S-75, Guerrero VF-88, Anahuac F-75 y Delicias F-81.

**FECHA DE ESTABLECIMIENTO:** Desde el establecimiento de las lluvias hasta el 10 de agosto.

**DENSIDAD DE SIEMBRA:** 100 kg/ha.

**CONTROL DE PLAGAS, MALEZAS Y ENFERMEDADES:** Ocasionalmente en ataques fuertes de gusano soldado, controlar con un L/ha de Gusatión Metílico 20 E, 0.5 kg/ha de Lannate 90 PS 25, o 1 L/ha de Malatión 1000 E. Puede atacar el pulgón del follaje y se controla con Pirimor 50 W a 0.5 kg/ha, o Malatión 1000 E a 1.0 L/ha, o Lannate 90 PS a razón de 0.4 kg/ha, o Folimat 84 LM a 0.4 L/ha.

**FERTILIZACIÓN AL ESTABLECIMIENTO:** Se recomienda incorporar con rastra antes de la siembra la fórmula 60-40-00.

**INICIO DEL CORTE O PASTOREO:** Aproximadamente a los 60-65 días de la siembra se recomienda el inicio del pastoreo. Si se quiere cortar para empacar se puede cortar en floración o grano formado.

**RENDIMIENTO ANUAL DE MATERIA SECA (MS):** Dependiendo del manejo se pueden obtener desde 1.5 hasta 3.0 t/ha.